

→ MINISTERE DE L'AGRICULTURE DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX Ancienne Conserverie de CASAMOZZA LUCCIANA - 20290 - BORGO -

7 95.36.05.70

EDITION CORSE

Bulletin Technique N° du 08 Octobre 1992

AGRUMES

La récolte s'annonce déficitaire en générale par rapport à l'an passé. Il convient cependant de ne pas négliger la protection des vergers en cas de besoin.

Cératite

Les captures sont faibles à nulles ; Pas de Traitement. Installer les gobes mouches avec du liquide attractif Phosphate d'ammoniaque ou quelques gouttes de Buminal (mélangé à de l'eau).

Relevé journalier des pièges.

Aleurodes Floconeuses

Pas de traitement au "Lannate" ni a quoi que ce soit prédatisme est suffisamment important pour rétablir la situation.

Cicadelles

Tout début des captures ; mais la période pluvieuse a contrarié les migrations des vignobles aux vergers. Inutile d'intervenir.

CULTURES LEGUMIERES

Les protections fongicides contre les maladies du feuillage et du collet doivent être précoces pour être efficaces et ne pas laisser de résidus.

(Voir tableau des spécialités en Annexe 1

KAKI

On observe de nombreuses altérations sur les variètés "Sharon et Fuyu" qui déprécient l'aspect du fruit à l'extérieur et à l'intérieur.

Aucun traitement n'est susceptible d'entraver ces phénoménes qui seraient plutôt d'origines agronomiques..

---0000000---

⁽C) - S.R.P.V. - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.

TABLEAU DES SPECIALITES. FONGICIDES

PECIALITES OMMERCIALES	MATIERES ACTIVES	DOSES SC/ha	OBSERVATIONS (Délai d'emploi avant récolte, LMR, famille chimique, mode d'action.	
N PEPINIERES	(men	meh BE	EQAJAS-RUB	
ITHANE M 45 ILCOZEBE	mancozèbe 80 %	2 kg	4 mg/kg.dithiocarbamate.en préventif - action par contact.	
ITHANE DG RIMANOC DG	mancozèbe 75 %	2,1 kg		
RIMANOC bleu	mancozèbe 70 %	2,3 kg		
ONZEBE P	zinèbe 10 % 20 kg - 4 mg/kg dithiocarbamate en préventif UNIQUEMENT en pépinières.			
DIAMIX P 20	thirame 10 % + zinèbe 8 %	20 kg	- 4 mg/kg dithiocarbamate - attention aux températures très froides.	
Z 16 poudrage	thirame 8 % + zinèbe 8 %	20 kg	- pépinières UNIQUEMENT.	
CULTURE				
RANEOR	manèbe 70 %	2,3 kg	- dernier traitement : stade 16-18 feuilles de plus de 3 cm².	
ANEOR	manèbe 435 g/l	41	 - 4 mg/kg. - dithiocarbamate. - en préventif, action par contact. - risque de phytotoxicité sur jeunes semis. 	
EMILTINE S	cymoxanil 4 % + mancozèbe 46,5 %	2 kg	- dernier traitement : stade 16-18 feuilles de plus de 3 cm².	
LVAX 2000	cymoxanil 6 % + mancozèbe 70 %		2 mg/kg + 4 mg/kg.amide + dithiocarbamate.action préventive par contact.	
RHODAX	phoséthyl Al 44 % + mancozèbe 26 %	2,5 kg	<pre>- dernier traitement : stade 16-18 feuilles de plus de 3 cm² éthyl-phosphite : 5 mg/kg (soit acide phosphorique : 50 mg/kg) + mancozèbe : 4 mg/kg.</pre>	
	secilini ter		- monoéthyl phosphite métallique + dithiocarbamate. - action préventive. - dernier traitement - stade 16-18 feuilles.	
PULSAN PEPITE PULSAN	cymoxanil 3,2 % + mancozèbe 56 % + oxadixyl 8 %	2 kg	 dernier traitement : stade 16-18 feuilles de 3 cm². 2 mg/kg + 4 mg/kg + 0,2 mg/kg. amide + dithiocarbamate + phénylamide. (SRPV-PACA 91/10) 	

Sur la base de 1000 1/ha en plein.

P67

TENEURS EN RESIDUS DE FONGICIDES ADMISSIBLES SUR SALADES (en ppm)

12/3/10/11					
GROUPE CHIMIQUE	MATIERE ACTIVE	FRANCE	R.F.A.	SUISSE	
Dithiocarbamates Mancozèbe) Manèbe) Zinèbe) somme Thirame)		4 (CS2)	2 (CS2)	2 (CS2)	
Dérivés du Benzène	Quintozène (PCNB)	0,5	0,3 (salade)	of a keelless	
Dicarboximides:	arboximides : Iprodione Procymidone Vinchlozoline		10 1 5	6 2 5	
Amines	Mépronil	1		Breithin 45	
Phénylurées	Pencycuron	2	0,05		
Acétamides	Cymoxanil	2 7 2 8 2 2	deres	0	
Monoéthyl phosphites métalliques	Phoséthyl Al – Ethyl phosp. – Acide phosph.	5 50		1,50 25	
Oxazilidinones	Oxadixyl	0,2	0,05		
Produits simples	Soufre Cuivre	50 20	50 20	50 -15	
Brome	100	50	100		

PULSAN = MONCEREN L BASITAC 75 PM

Fongicides Anti Rhizoctonia ne sont pas autorisés en Suisse